


Peritonite: atenção aos sinais.



A peritonite é uma **inflamação grave do peritônio**, membrana que reveste a cavidade abdominal e os órgãos internos. Geralmente é causada por infecções bacterianas ou fúngicas e requer atendimento imediato.

SINTOMAS MAIS COMUNS

- Dor abdominal intensa
- Abdômen rígido ou distendido
- Febre e calafrios
- Náuseas, vômitos e perda de apetite
- Diminuição da urina e prisão de ventre

IMPORTANTE

A CONTAMINAÇÃO DO
CATETER É A PRINCIPAL
CAUSA DE PERITONITE



CUIDADOS COM O CATETER

Higienize as mãos

Lave bem as mãos com água e sabão antes de manipular o cateter ou qualquer material relacionado à diálise

Mantenha o curativo sempre limpo

O curativo deve ser trocado regularmente ou sempre que estiver úmido, sujo, solto ou com sinais de contaminação

Evite banho de imersão

Fique atento aos sinais de infecção

Procure assistência imediatamente caso observe:

- Vermelhidão, inchaço ou dor ao redor da saída do cateter
- Presença de secreção ou odor desagradável
- Febre ou mal-estar
- Saída de líquido turvo durante a drenagem da diálise



LEMBRE-SE

- Não varra o quarto para evitar levantar poeira. Faça a limpeza do piso com pano úmido, água, sabão e água sanitária
- Não sacudir lençóis, cobertores ou colchas ao arrumar a cama
- Limpe as paredes com água e água sanitária uma vez por mês
- Mantenha o ambiente livre de mofo nas paredes, teto e piso
- Limpe diariamente a área sob a máquina após a diálise, utilizando pano úmido
- Lave os clamps após a desconexão com água e sabão, seque bem e guarde-os em recipiente limpo com tampa
- Higienize o recipiente dos clamps uma vez por semana com água, sabão e álcool
- Realize a instalação da diálise utilizando camisa de manga curta